Bilag 4: Efterundersøgelse og vaccination efter purulent meningitis

Ved udskrivelsen:

- Afsluttende objektiv undersøgelse, opfølgning på alle prøvesvar og skriftlig anmeldelse til SSI.
- Hvis ingen positiv ætiologi, kan MAT test gentages mhp. titerstigning (alternativt ved ambulante efterkontrol).
- Alle børn med purulent meningitis henvises til audiologisk afdeling mhp. hørescreening inden for 4 uger.
- Vurdér behov for opfølgning i andre specialer (f.eks. ortopædi, brandsår, nefrologi)
- Tid til ambulant kontrol 4-6 uger efter udskrivelse.

Ved ambulante kontrol:

- Pt. undersøges klinisk incl.hovedomfang hvis mindre barn
- Eventuelle sequelae identificeres og der henvises til relevante instanser.
- Børn med pneumokokmeningitis anbefales vaccination mod pneumokokker i henhold til anbefalinger fra SSI. Se nedenstående skema og link (downloaded 09.05.2019).
- Hos børn med meningokok- og pneumokokmeningitis tages IgG, A og M samt komplementundersøgelse (hvis ikke taget under indlæggelsen).
- Når meningokok serotypen foreligger kontaktes familien fra SSI og de personer, der var omfattet af den primære profylakse tilbydes relevant meningokokvaccination ved egen læge mhp. udryddelse af bærertilstand.

Tabel 2. Vaccinationsprogram ved primær pneumokokvaccination af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom (klausuleret tilskud kan søges til vacciner markeret med fed skrift)

Alder ved 1. vaccination, dvs ikke tidligere pneumokokvaccineret	Primær serie PCV13	Booster PCV13	Booster PPV23
2-6 måneder	3 doser PCV13 med minimum 1 md. mellemrum	**1 dosis PCV13 i 11-15 mdrs. alder**	**Fra 24 mdr: 1 dosis PPV23 mindst 8 uger efter PCV13**
7-12 måneder	2 doser PCV13 med minimum 1 md. mellemrum	1 dosis PCV13 i 11-15 mdrs. alder	**Fra 24 mdr: 1 dosis PPV23 mindst 8 uger efter PCV13**
12-23 måneder	2 doser PCV13 med minimum 2 mdr. mellemrum		**Fra 24 mdr: 1 dosis PPV23 mindst 8 uger efter PCV13**
2-6 år	**2 doser PCV13 med minimum 2 mdr. mellemrum**		**1 dosis PPV23 mindst 8 uger efter PCV13**
Over 6 år	**1 dosis PCV13**		**1 dosis PPV23 mindst 8 uger efter PCV13**

https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom