



Dit nyfødte barn har åben henvendelsesret på:



De kan kontaktes hele døgnet på telefonnummer:



Tidligt indsættende infektion

Vejledning til dig der har et nyfødt barn med øget risiko for infektion

Gruppe B streptokokker (GBS) er en bakterie som mange kvinder er raske bærere af. Den kan i meget få tilfælde give anledning til sygdom hos det nyfødte barn.

Hvis der er risiko for GBS sygdom gives antibiotika til mor under fødslen.

Efter fødslen observerer man barnet. Det kan foregå på barselsafsnit eller i hjemmet.

Risikoen for infektioner er størst de første 3 dage efter fødslen.

De første 3 døgn efter fødslen skal du være særlig opmærksomme på følgende:



- Barnet sover mere og vågner ikke til måltider ca. hver 3.-4. time
- Barnet er ikke interesseret i at spise eller spiser med mindre kraft og i kortere tid
- Barnet gylper tiltagende



- Barnet græder mere og kan ikke trøstes
- Barnet bliver slapt og stille



- Barnets vejrtrækning ændres: bliver hurtig, anstrengt, lyder besværet eller er langsom
- Barnets hudfarve ændres: bliver bleg eller grålig
- Barnet føles unormalt varmt eller koldt på huden

I observerer noget af det beskrevne på listen

eller

er bekymrede for at barnet ikke er tilpas

**Ring til hospitalet
se bagside for tlf nr**